

PASAPORTE **Párkinson**

Información importante en caso
de necesitar ayuda

POR FAVOR LÉALO

Tengo la enfermedad de Parkinson y ésta afecta a mi capacidad para hablar, coordinar e iniciar los movimientos.

¿Cómo puede ayudarme?

Por favor

- Deme tiempo cuando esté caminando, hablando y comiendo
- Hable normalmente y sea paciente cuando me resulte difícil hacerme entender
- Tenga en cuenta que el Parkinson afecta a músculos faciales y sonreír puede resultar difícil. Puede que no sea capaz de responder como a usted le gustaría que lo hiciera
- No me empuje o tire de mí si estoy teniendo dificultades para moverme
- Asegúrese de que estoy sentado antes darme una bebida
- No camine lejos de mí si estoy experimentando dificultades.

Sobre todo, sea paciente y deme tiempo.

Gracias

La Asociación Europea de Párkinson (EPDA) desea mostrar su agradecimiento a las personas con enfermedad de Parkinson, a sus familiares y a los profesionales de la salud que han prestado asesoramiento y asistencia durante el desarrollo de éste pasaporte.

Datos Personales

Nombre: _____

Apellido: _____

Fecha de nacimiento: _____

Dirección: _____

Población/Ciudad: _____

País: _____

Código postal: _____

Teléfono: _____

Móvil: _____

Correo electrónico: _____

DATOS PERSONALES

┌ ───────────┐

└ ───────────┘

Contactos de emergencia

Persona de contacto: _____

Relación: _____

Teléfono: _____

Móvil: _____

Persona de contacto: _____

Relación: _____

Teléfono: _____

Móvil: _____

Persona de contacto: _____

Relación: _____

Teléfono: _____

Móvil: _____

Mi médico: _____

Dirección de contacto: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

CONTACTOS DE EMERGENCIA

Medicación

Es muy importante que tome mi medicación en el momento correcto.

Ésta es:

Nombre del fármaco: _____

Dosis: _____

Horario: _____

Nombre del fármaco: _____

Dosis: _____

Horario: _____

Nombre del fármaco: _____

Dosis: _____

Horario: _____

Nombre del fármaco: _____

Dosis: _____

Horario: _____

Nombre del fármaco: _____

Dosis: _____

Horario: _____

Nombre del fármaco: _____
Dosis: _____
Horario: _____

Nombre del fármaco: _____
Dosis: _____
Horario: _____

Nombre del fármaco: _____
Dosis: _____
Horario: _____

Nombre del fármaco: _____
Dosis: _____
Horario: _____

Nombre del fármaco: _____
Dosis: _____
Horario: _____

Nombre del fármaco: _____
Dosis: _____
Horario: _____

Otros fármacos que tomo regularmente

Información importante

Firma del médico o sello

Fecha:

Fármacos que deben evitarse

1. Neurolépticos clásicos (p.ej., haloperidol,...)
2. Proclorperazina
3. Metoclopramida
4. Ciclizina
5. Neurolépticos atípicos (p.ej., risperidona, olanzapina) aunque pueden ser más seguro que los agentes típicos

Nota: Si es necesario un antiemético utilizar domperidona
Si requiere el uso de un anti-psicótico atípico utilizar quetiapina

6. Petidina y otros opiáceos (analgésicos) no deben utilizarse junto a selegilina y rasagilina

Duodopa, infusión de gel mediante bomba intraduodenal


La bomba de Duodopa es un dispositivo electrónico, el cual mediante unos tubos se inserta directamente al duodeno o yeyuno superior.

El fármaco que dispensa Duodopa es un gel contenido en un casete que se envía al intestino durante su uso. La bomba debe ser manejada únicamente por un profesional de la salud o un cuidador, capaz de hacerlo. [Por favor, consulte las instrucciones del fármaco para las dosis y horarios]

Mi medicación es administrada de manera continua al intestino por una bomba

Inicié el tratamiento con bomba de Duodopa en: _____ (dd/mm/aaaa)

Número de serie de la bomba: _____



Puedo experimentar dificultades en la manipulación de la bomba y la conexión del tubo, que puede dar lugar a complicaciones.

Puede ser necesario que un cuidador me asista.

IMPORTANTE

- Si necesito anestesia general, el tratamiento con Duodopa puede continuar durante el tiempo que pueda tomar líquidos y fármacos por vía oral.
- Si el tratamiento debe detenerse temporalmente, podré iniciar Duodopa con la misma dosificación tan pronto como la ingesta de líquido este permitida.
- Otros productos farmacológicos que puedan ocasionar hipotensión ortostática deben administrarse con precaución.
- La bomba puede ser utilizada en aviones sin interferir en los equipos electrónicos. [Por favor ,ver el informe médico adjunto]